


Abendsegler (AT)
Raniak hrzdavý (SK)

Nyctalus noctula
Häufig in der Abenddämmerung zu beobachten, im Herbst auch nachmittags unterwegs.
Fliegt sehr hoch, zwischen 15 und 40 m, der Flug ist schnell und direkt.
Kinder können die Ortungsrufe hören (17 – 18 kHz), Erwachsene meist nicht
Flügelspannweite: 35 cm; Gewicht: 20 – 40 g

Bratislava und Wien: In der Stadt vom Stadtwald bis in das Zentrum weit verbreitet.



Weißbrandfledermaus (AT)
Večernica južná (SK)

Pipistrellus kuhlii
Sehr ähnlich der Zwergfledermaus, kann oft jagend an Straßenlampen beobachtet werden.
Zwängt sich tagsüber in kleine Spalten an Gebäuden/Häusern.
Im Herbst kann sie durch ihre Soziallaute (nur mit einem Fledermaus-Detektor) bestimmt werden.
Flügelspannweite: 22 cm; Gewicht: 5 – 10 g

Bratislava und Wien: Kommt bevorzugt im Stadtinneren und in verbauten Siedlungsgebieten vor, auch in der Nähe von landwirtschaftlich genutzten Flächen.



Mausohr (AT)
Netopier obyčajný (SK)

Myotis myotis
Eine der größten Fledermausarten in Europa, jagt bevorzugt Laufkäfer am Boden.
Fliegt erst aus, wenn es dunkel ist, daher bitte keine Beleuchtung an Kirchen!
Flügelspannweite: 40 cm; Gewicht: 20 - 40 g


Bratislava und Wien: In Städten generell sehr selten und eine Besonderheit für Wien!
Entdeckung eines Quartiers mit 90 Weibchen und 50 Jungtieren.
Nachgewiesene Distanz zwischen Quartier und Jagdgebiet eines Individuums: 3 – 4 km
Dies entspricht der Strecke vom Bahnhof Hütteldorf bis zum Hohenauer Teich im Lainzer Tiergarten



Zwergfledermaus (AT)
Večernica malá (SK)

Pipistrellus pipistrellus
Eine unserer kleinsten Fledermausarten, fängt Insekten im schnellen Flug.
Nutzt Spalten an Gebäuden, jagt gerne im Wald und am Wasser.
Flügelspannweite: 20 cm; Gewicht: 3 - 8 g

Bratislava und Wien: An den Stadträndern und in locker verbauten Stadtteilen.



Kleine Hufeisennase (AT)
Podkovár malý (SK)

Rhinolophus hipposideros
Schwer zu beobachten - fliegt bei Dämmerung aus ihrem Quartier, kann aber nur direkt beim Ausflug beobachtet werden. Dann verschwindet sie in der Dunkelheit.
Flügelspannweite: 20 cm; Gewicht: 4 - 10 g

Bratislava und Wien: Eine Besonderheit in Bratislava! Bekannte Quartiere liegen in verlassenem Gebäuden nahe dem Stadtwald. Generell in Städten kaum vorkommend, ausnahmsweise in Randbereichen, aber auch hier sehr selten.



Wasserfledermaus (AT)
Netopier vodný (SK)

Myotis daubentonii
Lebt in Bäumen und seltener in Brücken. Fliegt knapp über dem Wasser, keschert mit ihren großen Füßen Fliegen und andere Insekten von der Oberfläche.
Am besten lassen sie sich beobachten, in dem die Wasseroberfläche mit rotem Licht abgesucht wird.
Flügelspannweite: 25 cm; Gewicht: 7 - 10 g

Bratislava und Wien: Kommt bevorzugt nahe an Gewässern vor, z.B. an der Donau, der March, stehenden Gewässern und im Augebiet.