


Raniak hrzdavý Abendsegler (AT)

Nyctalus noctula

Je často pozorovateľný počas stmievania, na jeseň sa pohybuje vonku aj popoludní. Lieta veľmi vysoko, vo výške 15 až 40 m, let je rýchly a priamočiary. Deti dokážu zachytiť echolokačné volania (17-18 kHz), dospelí väčšinou nie.

Rozpätie krídiel: 35 cm; hmotnosť: 20-40 g

Bratislava a Viedeň: Veľmi rozšírený v meste od mestských lesov až po centrum.



Večernica južná Weißrandfledermaus (AT)

Pipistrellus kuhlii

Veľmi sa podobá večernici malej, často ju možno pozorovať počas lovu pri pouličných lampách. Cez deň sa ukrýva vtisnutá do úzkych škár na budovách/domoch.

Na jeseň ju možno určiť podľa sociálnych volaní (iba pomocou ultrazvukového detektora).

Rozpätie krídiel: 22 cm; hmotnosť: 5-10 g

Bratislava a Viedeň: Vyskytuje sa prednostne v centre mesta a v zastavaných sídelných oblastiach, aj v blízkosti pôdohospodársky využívaných plôch.



Netopier obyčajný Mausohr (AT)

Myotis myotis

Jeden z najväčších druhov netopierov v Európe, s obľubou loví na zemi chrobáky z čeľade bystruškovité. Vyletuje až po zotmení, preto je vhodné limitovať osvetlenie na kostoloch.

Rozpätie krídiel: 40 cm; hmotnosť: 20-40 g

Bratislava a Viedeň: V mestách sa všeobecne vyskytuje len zriedkavo a vo Viedni je vzácný! Bol objavený úkryt s 90 samicami a 50 mláďatami. Zdokumentovaná vzdialenosť medzi úkrytom a loviskom jedinca je 3 – 4 km. Zodpovedá to približne trase od Dómu sv. Martina až po ZOO Bratislava.



Večernica malá Zwergfledermaus (AT)

Pipistrellus pipistrellus

Patrí medzi naše najmenšie druhy netopierov, loví hmyz počas rýchleho letu. Využíva škáry na budovách, rada loví v lese a pri vode.

Rozpätie krídiel: 20 cm; hmotnosť: 3-8 g

Bratislava a Viedeň: V okrajových zónach a riedko zastavaných častiach mesta.



Netopier vodný Wasserfledermaus (AT)

Myotis daubentonii

Žije na stromoch a zriedkavejšie v mostných konštrukciách. Lieta tesne nad vodou, naberá svojimi veľkými nohami muchy a iný hmyz z hladiny. Najlepšie ho možno pozorovať prehľadávaním vodnej hladiny červeným svetlom.

Rozpätie krídiel: 25 cm, hmotnosť: 7-10 g

Bratislava a Viedeň: Vyskytuje sa s obľubou v blízkosti vody, napr. pri Dunaji, Morave, pri stojatých vodách a v lužných oblastiach.